

Niektóre nowotwory dotyczą częściej osób zakażonych HIV

W wydaniu *Annals of Internal Medicine*¹ z 20 maja 2008r. ukazało się doniesienie badaczy amerykańskich, w którym porównano obserwacje prowadzone w latach 1992 – 2003 wśród 54 780 osób żyjących z HIV z danymi dotyczącymi 334 802 121 osób z 13 rejestrów zachorowań na nowotwory, prowadzonych w USA.

Wykazano w nich, iż częstość zachorowań wśród osób żyjących z HIV na niektóre nowotwory nie definiujące AIDS jest większa, niż w populacji ogólnej. Dotyczy to przede wszystkim raka odbytu, a także pochwy, chłoniaków Hodgkina, raka wątroby, płuc, czerniaka złośliwego, nowotworów jamy ustnej, białaczki, raka jelita grubego i nerek. Rak prostaty rzadziej dotyczył zakażonych HIV mężczyzn. Badacze nie uwzględnili palenia papierosów, ani różnic w częstości wykonywania badań przesiewowych w kierunku schorzeń nowotworowych.

Wnioskiem wynikającym z tych badań jest zalecenie, by zarówno ludzie żyjący z HIV, jak i ich lekarze, byli świadomi istnienia tego ryzyka i wykazywali czujność w zwracaniu uwagi na objawy nowotworów. Wcześniej rozpoznany nowotwór jest zwykle całkowicie uleczalny.

26 maja 2008r.

¹ Patel P, Hanson DL, Sullivan PS i wsp., for the Adult and Adolescent Spectrum of Disease Project and HIV Outpatient Study Investigators. *Ann Intern Med* 2008;148:728-736.